

# Euonymus fortunei emerald'n gaiety half tige (CELASTRACEAE)

Gümüşi kısa tijli baston beyaz-yeşil yapraklı sürünücü taflan, sarmaşık sarılıcı taflan,



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fiyat</b>               | 0.00 ₺                               |
| <b>Kategori</b>            | Bonsai ve Şekil<br>Verilmiş Bitkiler |
| <b>Hassaslık</b>           | -                                    |
| <b>Soğuğa Dayanıklılık</b> | 4A (-34.4_-31.7) °C                  |
| <b>Sıcağa Dayanıklılık</b> | H2A (+26.8_+29.5) °C                 |
| <b>Kök Yapısı</b>          | Saçak köklü                          |
| <b>Gövde Rengi</b>         | -                                    |
| <b>Toprak Çeşidi</b>       | -                                    |
| <b>Dayanıklılık</b>        | -                                    |
| <b>Bitki Boyu</b>          | 2-5 metre                            |
| <b>Bitki Büyümesi</b>      | -                                    |
| <b>Sonbahar Rengi</b>      | Birden fazla renk                    |
| <b>Işık İsteği</b>         | Güneş, Yarı gölge                    |
| <b>Yaprak Durumu</b>       | Yaprak dökmez                        |
| <b>Yaprak Rengi</b>        | Birden fazla yaprağı<br>renkli       |



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Çiçeklenme Dönemi</b> | Mayıs         |
| <b>Çiçek Rengi</b>       | Sarı/Turuncu  |
| <b>Meyve Rengi</b>       | Kırmızı/Pembe |

Özellikle Çin, Kore ve Japonya'da 8 metreye kadar boylanan bitkilerdir. Yaprak döken ve dökmeyen türleri bulunmaktadır. 3 cm çapına ulaşabilen koyu kahverengi kabuğa sahip gövdesi vardır. Sürgünleri kırmızı kahverengi, yoğun minik kabuklarla kaplıdır. Yaprak döken türlerin çiçekleri Haziran ayında, dökmeyen türlerin ise Kasım ayında, tekli veya çiftler halinde dal koltuğunda bulunur, güzel kokulu, 4 loplu sarımsı, beyazımsıdır. Meyvesi oval veya yuvarlak sert çekirdekli. Azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir. Ayrıca kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle pek çok türü erozyonla mücadelede kullanılabilir.

Euonymus, fortunei, emerald'n, gaiety, Бересклет Форчуна Эмеральд Гаити, Gümüşi, kısa, tijli, baston, beyaz-yeşil, yapraklı, sürünücü, sarmaşık, sarılıcı, taflan, Wintercreeper, ةيباح, nerede yetişir

<https://katalog.ssmarmaragroup.com/euonymus-fortunei-emerald-n-gaiety-half-tige-celastraceae/gumusi-kisa-tijli-baston-beyaz-yesil-yaprakli-surunucu-taflan-sarmasik-sarilici-taflan>